

6. PLAGAS Y ENFERMEDADES

ENFERMEDADES	PRODUCTO	DOSIS /200 LITROS DE AGUA
Lancha	Patrón Poncho aguas	750 gr
		1kg
Tizon temprano, Alternaria solani y Septoria	Difo Xstrata gold	200 cc
		250 cc
Oidio	Acoidal Rodifon	1 kg
		500 cc
Pudrición blanda, Erwinia sp. y Rizoctonia, Rhizoctonia solani	Labicuper	1 litro
Roña, Spongospora subterranea	Captain Pilarstin	1 kg
		500 gr

En todos los casos se recomienda acondicionar el pH del agua, para lo cual se debe usar **100 cc de PH Check** y añadir al final de la mezcla un fijador agrícola, **Agropega 200cc** por 200 litros de agua.



7. COSECHA

Tradicionalmente la época de cosecha es a la madurez fisiológica de la planta, es decir, cuando el follaje se torna amarillento y se empieza a secar y cuando la cáscara de la papa no se pela fácilmente al presionar con el dedo pulgar.

8. COMERCIALIZACION

El producto cosechado se embala en sacos de 100 lb para destino industria, y en el caso de mercado local depende de la zona, ya que en algunos casos embalan en sacos que fluctúa entre 125-150 lb por saco, de color variable, con o sin logotipo de origen, y para semilla por lo general en sacos malos.

BELLAGOO
INSECTICIDA AGRÍCOLA

KOMPRESSOR
INSECTICIDA AGRÍCOLA

**DOBLE IMPACTO
CONTRA
LA PUNTA MORADA**

*Kompessor en proceso de ampliación de registro.

ASESORÍA GRATUITA
098-59-59-555
ESCRÍBENOS Ó LLÁMANOS

www.agrosad.com.ec

Agrosad
Productos Agropecuarios



HELM

**guía de cultivo
papa**

guía de cultivo papa

1. SELECCIÓN DE LA SEMILLA:

Debemos garantizar que la semilla que se va a sembrar, tenga una sanidad probada y en el caso de tener nuestra propia semilla, ésta debe ser la cosecha de las mejores plantas del lote, con un tamaño entre 60-120 gr y brotación múltiple para garantizar una abundante cosecha.

2. DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA:

Se realiza por inmersión, se puede dejar secar y guardar o sembrar, también se puede realizar una desinfección por aspersión antes de la siembra y luego en el surco de siembra, para todos los casos usar: Labicuper 500cc + Captain 500 gr + Nairobi 250cc. En 200 Litros de agua.

Prevenimos pudriciones bacterianas y ataque de hongos, al mismo tiempo que nos protegemos de gusano blanco y Paratíozia



3. SIEMBRA:

Densidad de siembra 25 a 30 qq/Ha

Distancia de siembra: Entre 1,1-1,3m entre surcos y entre plantas 0,25-0,4, depende del sistema de cultivo, la variedad y la finalidad de la producción (mercado, semilla, industria)

Semilla por sitio: 1 a 2 tubérculos dependiendo el tamaño de la semilla.

4. LABORES CULTURALES

Se puede aplicar herbicida antes de la emergencia de la papa (desde los 7 hasta los 20 días después de la siembra), usar Lina 1 kg/ha, Rascadillo y medio aporque 45 días, Aporque 60-70 días

5. FERTILIZACIÓN:

Usar **Retardo y Humusolub** 1 saco de cada uno, tanto en la fertilización de fondo, como en la cobertera. Complementando con fertilizantes foliares como se detalla a continuación:

Fertilizante	Fase de aplicación	Detalles	Dosis 400 L
Fuerza Verde Especial	Inicio y desarrollo	Estimula la brotación, desarrollo, crecimiento vegetativo, abundantes hojas, proceso de fotosíntesis	2 kilos
Labin Baby			500 cc
Fuerza Verde Floración	Floración	Induce la floración, aumenta el número de tubérculos, corrige estados carenciales de fósforo	2 kilos
Labicuaje			1 kilo
Labifol Sugar K	Engrose y final	Rico en potasio, aumenta el tamaño y llenado de los tubérculos.	500 cc
Labiquantum	Usar solo hasta Floración	Interviene en la formación de la biomasa radicular, favorece un mayor estoloneo y un mejor tamaño de tubérculo.	1 litro



6. PLAGAS Y ENFERMEDADES

PLAGA	PRODUCTO	DOSIS /200 LITROS DE AGUA
Gusano blanco y polilla	Nairobi Kompressor Sharfip	250 cc
		250 cc
		250 cc
Pulgüilla	Nairobi Cedrus	250 cc
Pulgón minador, trips y Paratíozia (Bactericera cockerelli),	Bellagio cridor moskatió 50%	100 gr
		200 cc
		500 gr



*Los productos y las dosis indicadas se pueden utilizar uno a la vez, y realizar rotación con los otros productos.

Para control de adultos de gusano blanco se recomienda colocar trampas, que consisten en ramas frescas de papa (previamente envenenada con **CENTIÓN (Acephato 2 gr/l)**, cubiertas por un cartón de 40x40 cm. Los insectos serán atraídos por el olor de las ramas de papa y mueren al alimentarse de las hojas tratadas con insecticida.